



À partir d'une série d'informations, il va falloir trouver le nom de chacune des six molécules suivantes. Toutes ces molécules sont utilisées dans l'industrie pharmaceutique.

La réponse et la démarche doivent être rédigées sous forme d'un rapport en répondant aux questions suivantes :


- 1/ Donner la formule développée de la molécule 5.
- 2/ Identifier les six molécules en rédigeant une argumentation




molécule 1




molécule 2




molécule 3



molécule 4



molécule 5



molécule 6


Information 1 :

Les molécules utilisées pour leurs vertus thérapeutiques comportent des groupes d'atomes leur conférant des propriétés chimiques spécifiques ; ces groupes d'atomes sont appelés **groupes caractéristiques**.


Exemples de groupes caractéristiques :



hydroxyle




carboxyle



ester



amine



amide

Information 2 :

L'acétyl-leucine, dont l'action sur le vertige de la souris a été découverte en 1957, est utilisée depuis avec succès en clinique humaine comme médicament symptomatique des états vertigineux. Cette molécule comporte un groupe carboxyle et un groupe amide.

Information 3 :

La kératose pilaire est une maladie de peau se caractérisant par une sécheresse importante et la présence de squames (écailles de peau) très fines, ressemblant à des écailles de poisson, ce qui donne à la peau un aspect rêche.

Certains traitements thérapeutiques préconisent l'utilisation de modificateur de la kératinisation, tels que l'acide salicylique et l'acide lactique.

Ces deux molécules possèdent les mêmes groupes caractéristiques : un groupe carboxyle et un groupe hydroxyle, mais la molécule d'acide salicylique est cyclique, contrairement à celle d'acide lactique.

Information 4 :

Le paracétamol, l'aspirine et l'ibuprofène sont des espèces chimiques utilisées en médecine pour leurs propriétés antalgique (ou analgésique) et antipyrétique (ou fébrifuge). Elles constituent le principe actif de nombreux médicaments commercialisés sous des noms variés.

La molécule d'ibuprofène ne comporte qu'un groupe caractéristique : le groupe carboxyle.

La molécule d'aspirine comporte deux groupes caractéristiques : carboxyle et ester.

La molécule de paracétamol comporte deux groupes caractéristiques : amide et hydroxyle.

Information 5 :

L'aspirine est le nom usuel de l'acide acétylsalicylique. Cette molécule est synthétisée par transformation chimique de l'acide salicylique.


Au cours de cette synthèse, le groupe hydroxyle de l'acide salicylique est transformé en groupe ester, tandis que le reste de la molécule ne change pas.

Information 6 :

Contrairement à l'aspirine, le paracétamol peut généralement être utilisé par les personnes qui suivent un traitement anticoagulant.

La synthèse du paracétamol est effectuée par transformation chimique du para-aminophénol.

Au cours de cette synthèse, le groupe amine du para-aminophénol est transformé en groupe amide, tandis que le reste de la molécule est inchangé.



para-aminophénol